

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότερες Indicator Conditions ανά ειδικότητα και πιθανότητα χαμένων ευκαιριών

Ειδικότητα	Συχνότερες ICs	Πιθανότητα ΜΟ (%)	Κλινική Σημασία
Παθολογία / Γενική Ιατρική	Ανεξήγητος πυρετός, απώλεια βάρους, λεμφαδενοπάθεια, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις	25–40	Πρώιμη διάγνωση μειώνει νοσηρότητα.
Δερματολογία	Στοματική καντιντίαση, HSV, δερματικές βλάβες Kaposi sarcoma	30–45	Δερματικές εκδηλώσεις εμφανίζονται νωρίς αλλά συχνά αποδίδονται σε άλλες αιτίες.
Γυναικολογία	Ανεξήγητα STIs, HPV λοίμωξη, υποτροπιάζουσα κολπίτιδα	20–35	Γυναίκες με STIs υψηλού κινδύνου, συχνά παραλείπεται testing.
Πνευμονολογία	Πνευμονία, πνευμονοκύστη, ανεξήγητη βήχας	25–40	Ευκαιριακές λοιμώξεις μπορεί να είναι πρώιμο σύμπτωμα ανοσοκαταστολής.
Νευρολογία	Περιφερική νευροπάθεια, εγκεφαλίτιδα, AIDS-dementia	15–25	Συχνά προχωρημένη νόσος.
Αιματολογία / Ογκολογία	Λεμφοπενία, θρομβοπενία, λέμφωμα, Kaposi sarcoma	35–50	Συχνά αφετηρία διερεύνησης, αλλά χωρίς HIV test χάνεται η ευκαιρία.
Μικροβιολογία / Λοιμωξιολογία	CMV, PCP, candidiasis	30–45	Συχνά κατά τη νοσηλεία — κρίσιμη στιγμή για HIV testing.
Πρωτοβάθμια Φροντίδα	STIs, ανεξήγητος πυρετός, δερματικά εξανθήματα, λεμφαδενοπάθεια	35–50	Σημαντικός χώρος για έγκαιρη διάγνωση.