

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών

Χαρακτηριστικά ασθενών	Ποσοστό ασθενών % (N=121)
Φύλο	
Άνδρες	53
Γυναίκες	45
Μη διαθέσιμα δεδομένα	2
Διάρκεια ηλικία (έτη)	40
Φωτότυπος κατά Fitzpatrick	
I	-
II	14
III	62
IV	21
V	1
VI	-
Μη διαθέσιμα δεδομένα	3
Διάρκεια χρόνος από διάγνωση ατοπικής δερματίτιδας (έτη)	4
Ποσοστό ασθενών με ενεργές βλάβες ατοπικής δερματίτιδας	94
Εξάρσεις κατά τους τελευταίους 12 μήνες	
Καμία	2
Μία	11
Δύο	31
Τρεις	17
Πάνω από τρεις	40
Δερματικές συννοσηρότητες	
Καμία	83
Ψωρίαση	4
Γεροντική ξηροδερμία	1
Άλλο <i>[συμπ/νων: υπερκεράτωση, κνίδωση, δυσιδρωσικό έκζεμα, σπογγώδης δερματίτιδα]</i>	13
Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής πριν την αρχική επίσκεψη	
Λήψη φαρμακευτικής αγωγής	62
Είδος φαρμακευτικής αγωγής:	
<i>Τοπικά κορτικοστεροειδή (κυρίως Μεθυλπρεδνιζολόνη, Βουτοβατάτη, Κλοβεταζόλη, Μομεταζόνη)</i>	93*
<i>Ενυδατικά/καταπραΰντικά</i>	33*
<i>Αντιισταμινικά (κυρίως Λεβοσετιριζίνη, Μπιλαστίνη)</i>	18*
<i>Συστηματικά κορτικοστεροειδή (Μεθυλπρεδνιζολόνη)</i>	16*
<i>Άλλο (Κυκλοσπορίνη, Ντουπιλουμάμπη)</i>	16*

Το 62% των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφήθηκε φαρμακευτική αγωγή