

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα και συμμόρφωση ασθενών με αυτό.**Χορήγηση του υπό μελέτη ενυδατικού προϊόντος (N=121)****Συχνότητα**

1 φορά/ημέρα (πρωί) (%)

1

1 φορά/ημέρα (βράδυ) (%)

-

2 φορές/ημέρα (πρωί-βράδυ) (%)

99

Διάρκεια

Επ' αόριστον (%)

98

Τουλάχιστον 4 εβδομάδες (%)

2

Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής

Φαρμακευτική αγωγή (%)

55

Είδος φαρμακευτικής αγωγής:*Τοπικά κορτικοστεροειδή (κυρίως Μομεταζόνη, Μεθυλπρεδνιζολόνη και Κλοβεταζόλη) (%)*

71*

Αντιισταμινικά (κυρίως Λεβοσετιριζίνη, Μπιλαστίνη) (%)

15*

Συστηματικά κορτικοστεροειδή (Μεθυλπρεδνιζολόνη) (%)

3*

Άλλο (Απροκτινίμητη, Ντουπιλουμάμητη) (%)

30*

Σύσταση χρήσης συμπληρωματικού προϊόντος περιποίησης

Συμπληρωματικό προϊόν περιποίησης (%)

60

Είδος συμπληρωματικού προϊόντος περιποίησης:*Προϊόν καθαρισμού (%)*

75**

Αντηλιακή προστασία (%)

69**

Τοπική αλοιφή/κρέμα (%)

19**

Άλλο (%)

1**

Συμμόρφωση (%)

100

Μη τροποποίηση σύστασης για τη φαρμακευτική αγωγή τον τελευταίο μήνα (%)

98

Εφαρμογή της υπό μελέτη ενυδατικής κρέμας σε καθημερινή βάση (%)

99

*του 55% των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφήθηκε φαρμακευτική αγωγή,

**του 60% των ασθενών για τους οποίους έγινε σύσταση για χρήση συμπληρωματικού προϊόντος περιποίησης.