

Πίνακας 1. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών.

| Χαρακτηριστικά ασθενών | Ποσοστό ασθενών (N=800) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Φύλο | |
| Άνδρες (%) | 16 |
| Γυναίκες (%) | 84 |
| Διάρθρωση ηλικίας (έτη) | 41 |
| Διάγνωση (%) | |
| Μέλασμα (%) | 51 |
| <i>Επιφανειακό (%)</i> | 59* |
| <i>Μικτό (%)</i> | 41* |
| Εφηλίδες (%) | 31 |
| Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση (%) | 29 |
| <i>Σημάδια ακμής (%)</i> | 69** |
| <i>Ουλή μετά από τραύμα (%)</i> | 10** |
| <i>Σημάδι μετά από επέμβαση (%)</i> | 15** |
| <i>Άλλο (%)</i> | 5** |
| Άλλη (%) | 1 |
| Εντοπισμός | |
| Πρόσωπο (%) | 89 |
| Χέρια (%) | 15 |
| Ντεκολτέ (%) | 16 |
| Άλλο (%) | 2 |
| Φωτότυπος κατά Fritzipatrick | |
| I (%) | 2 |
| II (%) | 22 |
| III (%) | 57 |
| IV (%) | 17 |
| V (%) | 1 |
| VI (%) | - |

*του 51% των ασθενών με μέλασμα.

**του 29% των ασθενών με μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση.