

Πίνακας 3. Σχέδιο χορήγησης προϊόντος και συμμόρφωση ασθενών με τη συνιστώμενη θεραπεία.**Χορήγηση υπό έρευνα προϊόντος (N=800)****Τρόπος χρήσης**

Μονοθεραπεία	60
Συνδυαστική θεραπεία	38
Θεραπεία συντήρησης	2

Συχνότητα, ως μονοθεραπεία

1 φορά/ημέρα (πρωί) (%)	4*
1 φορά/ημέρα (βράδυ) (%)	22*
2 φορές/ημέρα (πρωί-βράδυ) (%)	74*

Διάρκεια, ως μονοθεραπεία

Έως 12 εβδομάδες (%)	17*
12 εβδομάδες (%)	79*
Πάνω από 12 εβδομάδες (%)	4*

Περιοχή εφαρμογής, ως μονοθεραπεία

Πρόσωπο (%)	90*
Χέρια (%)	15*
Ντεκολτέ (%)	15*
Άλλο (%)	1*

Θεραπευτικό σχήμα, ως συνδυαστική θεραπεία

Αισθητική πράξη	52**
Φόρμουλα Klingman	20**
Τρανεξαμικό οξύ	15**
Υδροκινόνη	14**
Άλλη τοπική/συστηματική θεραπεία	12**

Συχνότητα, ως συνδυαστική θεραπεία

1 φορά/ημέρα (πρωί) (%)	26**
1 φορά/ημέρα (βράδυ) (%)	22**
2 φορές/ημέρα (πρωί-βράδυ) (%)	52**

Διάρκεια, ως συνδυαστική θεραπεία

Έως 12 εβδομάδες (%)	22**
12 εβδομάδες (%)	68**
Πάνω από 12 εβδομάδες (%)	10**

Περιοχή εφαρμογής, ως συνδυαστική θεραπεία

Πρόσωπο (%)	90**
Χέρια (%)	15**
Ντεκολτέ (%)	23**
Άλλο (%)	3**

Συχνότητα, ως θεραπεία συντήρησης

1 φορά/ημέρα (πρωί) (%)

-

1 φορά/ημέρα (βράδυ) (%)

42***

2 φορές/ημέρα (πρωί-βράδυ) (%)

58***

Διάρκεια, ως θεραπεία συντήρησης

Έως 12 εβδομάδες (%)

42***

12 εβδομάδες (%)

33***

Πάνω από 12 εβδομάδες (%)

25***

Περιοχή εφαρμογής, ως θεραπεία συντήρησης

Πρόσωπο (%)

75***

Χέρια (%)

25***

Ντεκολτέ (%)

25***

Άλλο (%)

-

Συμμόρφωση (%)

Πλήρης (%)

88

Μερική (%) – τήρηση του σχεδίου κατά το ήμισυ

10

Χαμηλή (%) – τήρηση του σχεδίου λιγότερο από 50%

2

*του 60% των ασθενών που έλαβε το προϊόν ως μονοθεραπεία,

**του 38% των ασθενών που έλαβε το προϊόν ως συνδυαστική θεραπεία,

***του 2% των ασθενών που έλαβε το προϊόν ως θεραπεία συντήρησης.