

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κριτήρια για την πρώιμη έναρξη θεραπείας με βιολογικό παράγοντα ή μικρά μόρια.

Κριτήρια	Διευκρινίσεις
Ταχέως εξελισσόμενη νόσος	Οποιαδήποτε αύξηση του σταδίου Hurley μέσα σε <3 μήνες
Συνδρομική ΔΙ ή με φλεγμονώδεις συννοσηρότητες	Νόσος Crohn, αρθρίτιδα, γαγγραινώδες πυόδερμα
Συχνές φλεγμονώδεις εξάρσεις ΔΙ	≥3 εξάρσεις σε 12 εβδομάδες
Έναρξη στην παιδική/εφηβική ηλικία με οικογενειακό ιστορικό και φλεγμονή	Έναρξη στην παιδική/εφηβική ηλικία, θετικό οικογενειακό ιστορικό, IHS4 ≥4
Αντένδειξη χορήγησης αντιβιοτικών	
Hurley I και σοβαρή ΔΙ	Hurley I, IHS4 ≥11
Hurley II με συρίγγια (tunnels) και τουλάχιστον μέτρια ΔΙ	Hurley II, IHS4 ≥4 με παραγωγικά συρίγγια
Περιπτώσεις Hurley II και τουλάχιστον μέτρια ΔΙ	Hurley II, IHS4 >4
Hurley III με εκτεταμένη προσβολή	Hurley III, IHS4 ≥4 με προσβολή ≥3 περιοχών
Τουλάχιστον μέτρια νόσος σε μη γειτονικές ανατομικές περιοχές	IHS4 ≥4 και προσβολή τόσο των ανώτερων όσο και των κατώτερων περιοχών
Μικτός ή φλεγμονώδης φαινότυπος κατά Martorell	Όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως
Έκτοπος, συρρεών ή ουλτικός θυλακικός φαινότυπος	Όπως ορίζεται από τους Jemec και van der Zee
Τουλάχιστον μέτρια νόσος σε ειδικές ανατομικές εντοπίσεις	IHS4 ≥4 και συμμετοχή βουβωνικής, πρωκτογεννητικής, και γλουτιαίας περιοχής

* προσαρμοσμένο από Nikolakis G, et al. JEADV 2026;40:658-669